

IHERINGIA

SÉRIES CIENTÍFICAS
DO

MUSEU RIO-GRANDENSE DE CIÊNCIAS NATURAIS

BOTÂNICA

Nº 2

OUTUBRO DE 1958

BASIDIOMYCETES EURASION IN RIO GRANDE DO SUL — BRASÍLIA


1. *Ascomycetes*
Sclerotium
Trametes
Dicranomyces

JOHANNES RICK S. J.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

DIRETORIA DE CIÊNCIAS



Tôda correspondência referente à

"IHERINGIA"

deve ser enviada ao

**MUSEU RIO-GRANDENSE DE CIÊNCIAS
NATURAIS**

**Rua Coronel Vicente, 430 — Pôrto Alegre
Rio Grande do Sul — Brasil.**

Desejamos estabelecer permuta.

Deseamos establecer el cambio.

We wish to establish exchange.

Wir wünschen Austausch.

On désire établir l'échange.

Desideriamo il cambio.

JOHANNES RICK S. J.


BASIDIOMYCETES EUBASIDII IN RIO GRANDE DO SUL — BRASÍLIA

- I. Auriculariaceae
 - Sirobasidiaceae
 - Tremellaceae
 - Dacryomycetaceae
-


1 9 5 8

Officinas Gráficas da Imprensa Oficial


Pôrto Alegre



Digitized by the Internet Archive
in 2025



J. Rick SJ, 19-1-1869 — 6-5-1946
(Fotografia cîrca de 1925)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

BASIDIOMYCETES EUBASIDII IN RIO GRANDE DO SUL —

BRASILIA

1. Auriculariaceae, Sirobasidiaceae, Tremellaceae, Dacryomycetaceae.

JOHANNES RICK S. J.

Apresentação.

Com o presente fascículo, dou início à publicação do manuscrito do P. J. Rick S. J. sobre os basidiomicetos eubasídios do Rio Grande do Sul. Embora pronto há 10 anos, só agora as circunstâncias tornaram possível sua edição.

O original conta 592 páginas, das quais aqui se publicam as primeiras 46; ao todo se descrevem 2160 espécies e 330 variedades em 225 gêneros e 25 famílias; 23 gêneros, 633 espécies e 145 variedades foram estabelecidas por Rick. Em sua última redação, o manuscrito contém 237 espécies, 76 variedades e 7 gêneros novos para a ciência.

Quanto ao valor crítico do trabalho, veja-se o prefácio do autor e do editor; quanto à personalidade do autor, consulte-se a breve biografia anexa a este fascículo.

Zum Geleit.

Mit diesem Heft beginnt die Veröffentlichung des seit zehn Jahren fertigen Manuskriptes von P. J. Rick SJ über die Basidiomycetes Eubasidii von Rio Grande do Sul, Südbrasilien. Es enthält

im ganzen 592 Seiten, wovon hier die ersten 46 zum Abdruck kommen.

Rick beschreibt 2160 Arten und 330 Varietäten in 225 Gattungen und 25 Familien; davon sind 145 Varietäten, 633 Arten und 23 Gattungen von ihm selbsts aufgestellt worden. Die hiermit zur Veröffentlichung gelangende Fassung bringt 7 neue Gattungen, 237 neue Arten und 76 neue Varietäten.

Was die kritische Bewertung angeht, so sei auf die Einleitung des Verfassers und des Herausgebers hingewiesen; über die Person des P. Rick siehe den beigegebenen Lebensabriss.

Presentation.

This paper is the first of a series containing the Basidiomycetes Eubasidii of Rio Grande do Sul, South Brazil. The author, J. Rick SJ, deceased on May 6, 1946, left his manuscript nearly ready for publication but, until recently, this has been impossible. On 592 pages, of which the first 46 are given here, he describes 2160 species and 330 varieties in 225 genera and 25 families, out of which 23 genera, 633 species, and 145 varieties bear his name; in its final draft, the manuscript proposes 7 new genera, 237 new species, and 76 new varieties.

As to the critical evaluation of Rick's mycological work, see the author's and the editor's preface; see also the biographical sketch by the editor.

Pôrto Alegre, 23.8.1958.

B. Rambo SJ.

Preface by the Editor.

This book contains Father John Rick's final revision of the Basidiomycetes Eubasidii in Rio Grande do Sul, based on 43 years of mycological investigation in that country.

The author's sudden death unfortunately prevented him from fulfilling some technical exigencies, such as bibliography, nomenclature and critical revision of his herbarium.

The editor works at phanerogams; his knowledge in mycology does not surpass an external mastery acquired as an amanuensis and conservator of Rick's scientific legacy. Nevertheless, he resolved to publish the manuscript, for the following reasons:

In the first place, Rick made his main publications in periodicals of little circulation and difficult access, like *Broteria* and *Egatea*. Secondly, in the long course of his studies, Rick modified and corrected his opinions to an extent that only his ultimate edition will be able to give a true notion of his scientific evolution. Finally, Rick's strenuous field work and close examination of his collection, in the last years, brought to light a considerable number of new species and even genera, whose original description is given here. Because of the above mentioned imperfection of the manuscript, the editor sees himself obliged to leave the following points to the benevolence of the mycologists.

The system employed by Rick is that of *Natürliche Pflanzenfamilien* I. 1 (1900); the editor did not dare to accomodate it to the system adopted in the second edition, Band 6 (1928). Rick's divergences from Lindau, Hennings and Fischer have been left unaltered, as an expression of his own opinion.

The citations essentially follow Saccardo; in the editor's opinion, in many cases it was unnecessary to cite the original publications, since they may be easily found in the *Sylloge*. — Rick's own publications have been fully cited by periodical, volume and page; their full titles may be looked up in the complete list annexed to his biography.

As regards nomenclature, the editor limited his correctional work to the evident mistakes; all dubious questions have been left unchanged, although there can be no doubt, that a considerable number of names do not harmonize with the international rules. The professional mycologist, even so, will find his way without trouble.

According to Rick's own statement, many determinations in his herbarium are incomplete, dubious, antiquated or erroneous; the editor gives them as they are on the labels, trusting that the increasing interest in Brazilian fungi will clear up the mistakes, which may have crept into the work of the pioneer of South-Brazilian mycology.

Colegio Anchieta, Pôrto Alegre, May 6th, 1948.

B. Rambo, Botanist

Johann Rick S. J.

Biographical Notes.

Johann Rick, born at Dornbirn, Vorarlberg, Austria, on January 19th, 1869, was the son of the Grimbaumwirt (hotel-keeper and baker) Franz Rick. After having gone through the elementary school of his native town, he entered the Jesuit College Stella Matutina at Feldkirch, Vorarlberg, Austria, where he completed the secondary school, usual then in the Austrian Empire (1882-1887).

In 1887 he joined the Order of his Jesuit teachers undergoing their professional formation: two years of novitiate at Blyenbeck, two years of superior humanistic studies at Wynandsrade, and three years of philosophical formation at Exaeten, Holland.

In 1894 he went back to the Stella Matutina, Feldkirch, as a teacher of mathematics and natural history.

From 1898 to 1902 he studied theology at Valkenburg, Holland.

In 1903 he completed his Jesuit formation at Barro, Portugal.

In September 1903 he arrived in Brazil as a teacher in the Jesuit College at S. Leopoldo, Rio Grande do Sul, where he remained, with short interruptions, until 1915.

By that time, his health made a change of activity advisable. He gave up teaching, turned to spiritual and social work, and dedicated, during the following 14 years, his time, strength, and talent to the colonists of German origin in Rio Grande do Sul.

In 1929 he was appointed professor of theology at the Seminary of S. Leopoldo, this activity being often interrupted by pastoral and social works and illness.

The last years of his life, 1942-1946, he spent in the Jesuit preparatory school at S. Salvador, Rio Grande do Sul, where he dedicated himself entirely to mycological investigations.

Johann Rick died on May 6th, 1946, at the age of 77.

Rick had an innate inclination to the natural sciences. He made his first acquaintance with mycology during his years as a teacher at Feldkirch. Correspondence having brought him into contact with Bresadola and Rehm, he began studying the fungi of Vorarlberg; his first mycological publications are the fruit of these investigations.

During his stay at Valkenburg, he continued improving in his speciality.

In 1897 he began corresponding with the North-American

mycologists, chiefly Lloyd, with whom he maintained a productive scientific interchange until the death of that great mycologist.

In Rio Grande do Sul Rick devoted all time, that professional tasks and illness left him, to mycology. Maintaining exchange of ideas and material with Bresadola, Rehm, Sydow, Patouillard, Lloyd, etc., he undertook the heavy task of cataloguing and describing the Rio Grande do Sul Ascomycetes and Basidiomycetes. In this pioneer-work he was joined by the young and talented Ferdinand Theissen S. J., whom a sudden death in 1919 prevented from surpassing his master. During the 14 years of his pastoral and social enterprises, Rick had the opportunity of visiting the greater part of Rio Grande do Sul, a fact, which not only did not hinder, but even helped him in his scientific inquiries.

Rick was an almost entirely isolated mycologist in Southern Brazil. As he could not consult the whole mycological bibliography, nor personally compare his specimens with their types, his scientific work must needs be incomplete. Moreover, his continuous illness often interrupted his activities.

But in spite of such serious drawbacks, Rick's work represents a great achievement.

First of all, he was a great observer of living fungi. "My collection", he used to say, "is the forest". Therefore, his herbarium, incorporated to the Herbarium Anchieta under the name "Fungi Rickiani" (NN. 12001-23175) is of a rather occasional and fragmentary character. The greatest part of specimens collected between 1903 and 1929 have been sent to specialists, being now preserved in particular collections or in public museums, like the Botaniska Riksmuseet, Stockholm, the Lloyd Museum, Beltsville, Washington, and the Farlow Herbarium, Harvard University.

Notwithstanding their incompleteness, the "Fungi Rickiani", the main part of which has been systematically collected by Rick during the last 15 years, contain almost all types or cotypes and the greater part of the species described in this book. A collection of 1000 duplicates has been given to the Secretaria de Agricultura, Porto Alegre; another of 1600 to the Instituto Agronomico, Campinas, S. Paulo.

Rick's main papers have been published in the *Annales Mycologici*, in the *Broteria* (magazine of the Portuguese Jesuits, Lisboa), in the *Egatea* (*Revista da Universidade Tecnica de Porto Alegre*), and in the *Lilloa*; the articles which appeared in *Egatea* are extremely rare.

His mycological writings are as follows:

1 **Zur Pilzkunde Vorarlbergs**, österreichische Botanische Zeitschrift:

- a B. 48 (1898) 17-22.
- b B. 48 (1898) 59-63.
- c B. 48 (1898) 134-139.
- d B. 48 (1898) 339-343.
- e B. 48 (1898) 394-397.
- f B. 53 (1903) 159-164.

2 **Über die Schönheit der Pilze**, Natur und Offenbarung, 1898, **rum Brasiliensium**, Broteria, Vol. 6 (1907) 65-92.

3 **Eine neue Sclerotinia-Art**, Österreichische Botanische Zeitschrift, B. 50 (1900) 121-122.

4 **Os fungos brasileiros do Museu Botanico de Berlim e sua importancia systematica**, Relatorio do Gymnasio Nossa Senhora da Conceição, S. Leopoldo, 1904, 7-19.

5 **Über einige neue und kritische Pilze Südamerikas**, Annales Mycologici, B. 2, N. 3 (1904) 242-247.

6 **Über einige auf Bambus wachsende Hypocrateaceen**, Annales Mycologici, B. 2, N. 5 (1904), 402-406.

7 **Fungi austro-americi exsiccati**, Annales Mycologici:

Fasc. 1, B. 2, N. 5 (1904) 406-410.

Fasc. 2, B. 3, N. 1 (1905) 15-18.

Fasc. 3-4, B. 4, (N. 4 (1906) 309-312.

Fasc. 5-6, B. 5, N. 1 (1907) 28-31.

Fasc. 7-8, B. 5, N. 3 (1907) 335-338.

Fasc. 9-10, B. 6, N. 2 (1908) 105-108.

Fasc. 11-18, B. 9, N. 2 (1911) 175-184.

8 **Fungos do Rio Grande do Sul**, Broteria, Vol. 3 (1904) 276-293.

9 **Pilze aus Rio Grande do Sul**, Annales Mycologici, B. 3, N. 3 (1905) 235-240.

10 **Pilze aus Rio Grande do Sul**, Broteria, Vol. 5 (1906) 5-53.

11 **Deszendenz und Gattungsumgrenzung**, Natur und Offenbarung, B. 52 (1906) 408-414.

12 **Novitates Brasilienses**, Broteria, Vol. 5 (1906) 223-228.

13 **Contributio ad monographiam Agaricacearum et Polyporacea-**

14 **Die Gattung Geaster und ihre Arten**, Beihefte zum Botanischen Zentralblatt, B. 27, Abt. 2 (1910) 375-383.

15 **Evolução e constancia**, Relatorio do Gymnasio Nossa Senhora da Conceição, S. Leopoldo, 1911, 9-33.

16 **Contributio II. ad monographiam Agaricinearum Brasiliensium**, Broteria, Vol. 17 (1919) 101-111.

17 **Contributio III. ad monographiam Agaricinearum Brasiliensium**, Broteria Vol. 18 (1920) 48-63.

- 18 **Hypocreaceas novas do Rio Grande do Sul**, Egatea, Vol. 7 (1922) 396-398.
- 19 **Xylariaceas riograndenses**, Egatea, Vol. 8 (1923), 4-5
- 20 **O genero Eumeliola**, Egatea:
 - a Vol. 8 (1923) 484-494.
 - b Vol. 9 (1924) 27-38.
 - c Vol. 9 (1924) 131-131.
 - d Vol. 10 (1925) 34-40.
- 21 **Funai oelatinosi et cartilaginosi Riograndenses**, Broteria, Vol. 21 (1924) 134-141.
- 22 **Contributio ad monographiam Polyporacearum Riograndensium II.**, Broteria Vol. 21 (1924) 8-11.
- 23 **O aenro Fomes**, Egatea, Vol. 10 (1925) 253-260.
- 24 **Descrição de algumas especies novas da mycoflora riograndense**, Egatea, Vol. 11 (1926) 16-17.
- 25 **Resumo mycologico**, Egatea, Vol. 13 (1928) 432-439.
- 26 **Phalloideas riograndenses**, Egatea, Vol. 14 (1929) 299-308.
- 27 **Lyconerdiaceas riograndenses**, Egatea, Vol. 15 (1930) 19-30; 121-127; 222-230.
- 28 **Contributio IV. ad monographiam Agaricacearum Brasiliensium**, Broteria, Vol. 24 (1930) 97-118.
- 29 **Thelephoraceas riograndenses**, Egatea:
 - a Vol. 15 (1930) 306-311; 392-398.
 - b Vol. 16 (1931) 39-44; 116-124; 199-206.
- 30 **Monographia das Hypoxyleas riograndenses**, Broteria, Vol. 25 (1931) 21-50.
- 31 **Monographia Bolinearum Riograndensium**, Broteria, Vol. 25 (1931) 65-71.
- 32 **Monographia Helvellinarum Riograndensium**, Broteria, Vol. 26 (1931) 72-76.
- 33 **Entwicklungs- und geschichtliches aus der Pilzflora**, Festschrift 75 Jahre Stella Matutina, 1931. 330-337.
- 34 **Monographia Pezizinearum Riograndensium**, Broteria:
 - a Vol. 25 (1931) 35-46; 77-122.
 - b Vol. 26 (1932) 89-106.
- 35 **Monographia das Rosellinias riograndenses**, Broteria, Vol. 26 (1932) 183-192.
- 36 **Hydnaceas riograndenses**, Egatea:
 - a Vol. 17 (1932) 1-9; 101-110; 209-212; 274-280.
 - b Vol. 18 (1933) 39-46; 127-132.
- 37 **Monographia das Valsineas do Rio Grande do Sul**, Broteria, Vol. 18 (1933) 83-99.
- 38 **Monographia dos Protobasidiomycetos riograndenses**, Egatea, Vol. 18 (1933) 209-215; 285-288; 343-349.

Nidulariaceas riograndenses Egatea, Vol. 17-18

- 39 *Hymenogastrineas riograndenses*, Egatea, Vol. 19 (1934) 110-112. *also Egatea 14 (1929) 107-109*
- 40 *Monographia Sphaerialium astromaticorum Riograndensium*, Broteria, Vol. 28 (1933) 133-146; 170-202.
- 41 *Monographia das Xylariaceas riograndenses*, Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, Vol. 36 (1934) 41-71.
- 42 *Monographia Thelephoracearum resupinatarum Riograndensium*, Broteria, Vol. 30 (1934) 31-48; 66-80; 151-173. *Phot. at Kew*
- 43 *Polypori Riograndenses*, Broteria, Vol. 31 (1934-1935):
a 1934, 180-189.
b 1935, 17-27; 84-94.
- 44 *Dacrymycetes Riograndenses*, Broteria, Vol. 32 (1936) 74-79.
- 45 *Polysticti Riograndenses*, Broteria:
a Vol. 31 (1935) 121-138.
b Vol. 32 (1936) 171-178.
c Vol. 33 (1937) 81-87.
- 46 *Poriae Riograndenses*, Broteria, Vol. 33 (1937) 128-152.
- 47 *Polyporaceae Riograndenses*, Broteria, Vol. 33 (1937) 153-168.
- 48 *Agarici Riograndenses*, Lilloa:
a Vol. 1 (1937) 307-358. *- 346 only*
b Vol. 2 (1938) 351-386. *- ? 251-256*
c Bol. 3 (1938) 399-455.
d Vol. 4 (1939) 75104.
e Vol. 5 (1939) 13-30. *c.m.s. c.m.s. c.m.s.*
- 49 *Uma nova espécie de Agaricaceae*, Rodriguesia (Rio de Janeiro), N. 8 (1937) 43. *Kew*
- 50 *Monografia das Polyporineas Riograndenses*, Broteria, Vol. 34 (1938) 5-21.
- 51 *Resupinati Riograndenses*, Broteria, Vol. 34 (1938) 72-77. *Phot. at K.*
- 52 *O gênero Polystictus no Rio Grande do Sul*, Anais da primeira reunião sulamericana de Botânica (Rio de Janeiro), Vol. 2 (1938) 251-270. *O.P. B.L.V.*
- 53 *Polyporos Riograndenses*, Anais da primeira reunião sulamericana de Botânica (Rio de Janeiro), Vol. 2 (1938) 271-307.
- 54 *Septobasidia Riograndensia*, Broteria, Vol. 35 (1939) 194-195.
- 55 *Genus Stereum Riograndense*, Broteria, Vol. 36 (1940) 42-47; 75-90; 139-148. *Phot. at Kew*
- 56 *Resupinati Riograndenses II*, Annales Mycologici 38 (1940) 56-60. *C.m.s.*
- 57 *Recensentur fungi resupinati rari et novi*, Lilloa, Vol. 9 (1943) 215-219.

Praefatium auctoris.

Per quadraginta tres fere annos fungorum Riograndensium systemati operam dedi; quo in studio egregii mei temporis mycologi. Bresadola, Rehm, Sydow, Magnus, Patouillard, Lloyd, Martin, Thaxter, Spegazzini, Torrend, Theissen, Couch et alii collaborationem amice praestiterunt. Senex nunc et morti proximus revisionem hanc ultimam publici iuris faciendam putavi; quod, cum operis imperfectionem ego ipse primus concedere debeam, non sine haesitatione feci.

Immensam enim litteraturae molem in hac mea scientiarum naturalium ultima Thule videre non licuit, nec mea cum typis specimina propria manu comparare.

Typorum insuper revisio magna ex parte nondum facta est; et, ubi facta, propter conservationis statum, sporarum defectum, nomenclaturae difficultates, saepe magis auxit quam minuit confusionem. In universum loquendo, speciminum cum typis comparatio, praesertim cum de speciebus arcte similibus (Odontia, Corticium, etc.) agatur, dubii fere semper est valoris.

Criticam ergo typorum revisionem expectare non licuit; iustum enim non est, nec in rebus mycologicis mos, systematicarum disquisitionum publicationem propter solam typorum incertitudinem nomenclaturaeque formales quaestiones omittere.

Multa igitur ex traditione exstantia nomina, quorum typi forsitan numquam certo definiri possunt, adiecta descriptione e vegeto sporarumque mensura, completiore sensu ornavi; alias species descripsi novas, quas saltem meo sensu et saltem pro Meridionali Brasilia valorem, etsi multis in casibus provisorium, habituras confido.

Ita, Deo favente, aliquid ad mycologiae progressum me contribuisse non dubito.

Aliqua meae methodi generalia principia hic enumerare iuvabit. Fungi vivi in natura continua observatio maximi sane est momenti; mycologorum circa fungos exoticos exsiccatos interminabilis disquisitio non parvis laborat defectibus.

Notarum microscopicarum mensura, a plerisque mycologis nimio aestimata, valorem non excedit nisi generalem et relativum; quod etiam de sporarum dimensionibus dicere non haesito.

Earum notarum autem forma, in sporis praesertim, meliores praebet diacriticos characteres; sic, e g. sporae sphaericae numquam evadunt elongatae, nec vice-versa.

Sporarum in Basidiomycetibus mensuram feci in sicco, nisi aliter notetur.

Fungorum Brasiliensium colores mirum in modum variabiles

inveni; qua de causa, ne ponderosa synonymorum moles in dies magis magisque augeatur, speciminum quam plurimorum observatio in vegeto eorumque comparatio mihi imprimis cordi fuit.

Saccardoanum systema, ubi in sporarum colore insistit, artificiale semper putavi; naturam enim vivam in Procrustis lectulo comprimere vel distendere licitum non esse firmiter persuasum habeo. Sporas saepe inveni hyalinas in statu juvenili, coloratas in adulto.

Notas quoque diacriticas ipsas non semel inconstantes inveni. Peniophoras, Gloeocystidia, etc., cystidiis plane destituta pluries observavi. Odontiae corticioidis specimen in trunco erecto per quinque continuos annos cystidiis vacuum repperi; trunco autem caeso, iddem specimen, nunc ad humum versum, cystidia protulit non pauca.

Quamquam magna specierum in Brasilia Septemtrionali Centralique collectarum pars per Americam Meridionalem totam probabiliter diffusa existit, eas tamen solum species enumerare volui, quae a me vel ab aliis in Rio Grande do Sul vel in regionibus conterminis notatae sunt; flora enim haec cum regionibus argyropo-tamicis unitatem quandam geographicam constituere videtur.

Herbarii mei criticam revisionem, utpote senio morbisque fractus, facere non potui; qua de causa non pauci forsitan numeri ab aliis alii speciei tribuendi censebuntur.

In mycologiam me introduxit Giovanni Bresadola, magister meus carissimus Friesianaeque traditionis heres et custos; per quindecim annos studiis meis se adiunxit Ferdinand Theissen, discipulus meus magnaeque spei iuvenis, praematura morte ereptus; specimina mea cum typis, in quantum fas erat, comparavit Lloyd, mycologicarum rerum cultor fautorque eximius; quos omnes iam defunctos proxime secuturus grato animo saluto.

Herbarii mei et bibliothecae conservationem, manuscripti scriptionem, redactionem, editionem curavit Balduin Rambo SJ, phanerogamarum Riogransensium studiosus; cui senectutis meae benedictionem toto animo impertior.

Scribebam S. Salvador, ineunte anno 1946.

Johann Rick S. J.

AURICULARIACEAE

Stypinella Schröter.

Stypinella orthobasidion A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 161. — Rick, Egatea 18 (1933) 209.

Disseminata, 1-4 mm lata, mucedinea, alba. Basidiis rectis, septatis, $30 \times 0,5-2$ my. Sporis 7×5 my, hyalinis.

Fungi Rickiani 21059, S. Salvador 1944.

Stypinella intermedia Rick, Lilloa 9 (1943) 216.

Resupinata, immarginata, colliculosa, mucedinea, ceraceo-mollis, non gelatinosa, grisea, hirsuta; hyphis 4 my crassis, varie tortis, parce septatis, hyalinis. Basidiis initio piriformibus, pedicellatis, deinde elongatis, cylindricis, obtusis, septatis, $100-150 \times 10$ my. Sporis lateraliter in sterigmatibus positus, singulo terminali vel etiam laterali, hyalinis, valde obtuse apiculatis, sphaericis, 10 my.

Inter Stypinellam lolamque intermedia: hymenio basidioque piriformi uti in lola, ipsa basalis tamen cellula in basidium elongata uti in Stypinella.

Saccoblastia A. Möller.

Saccoblastia ovispora A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 162. — Rick, Egatea 18 (1933) 209.

Alba, mucedinea, 1 mm lata. Basidiis 100 my longis, liberis, septatis; sacco laterali 30×8 my. Sporis initio $13 \times 7-9$ my, dein 26×10 my. Ad ramos putridos.

Saccoblastia sphaerospora A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 162. — Rick, Egatea 18 (1933) 209.

Macroscopice sicut praecedens. Basidiis 45-60 my longis
Sporis sphaericis, 6-8 my. Sacco laterali sphaerico, 11 my.
Ad ramos putridos.

Saccoblastia gigaspora Rick, Lilloa 9 (1943) 217.

Aquosa, dein alba-tomentosa, membranacea. Basidiis 80 my
longis latisque, septatis; saccis rectis, saepe pedicellatis, 30-35x3
my, repletis, demum vacuis. Sporis 25x15 my, ovalibus, breviter
apiculatis. Dendrophysibus ramificatis, hyalinis, 3 my.

Ad lignum putridum.

Fungi Rickiani 14776, Montenegro 1942: Typus.

Iola A. Möller.

Iola orthosacca Rick, Egatea 18 (1933) 210.

Aquosa alba, effusa, resupinata, immarginata corticioides
gelatinosula, 1 mm crassa. Basidiis e cellula basali magna, ovali-
cylindrica, erecta ortis, cylindricis, longis, septatis, vetustate tortis
Sporis albis, cylindricis, 8-10x5 my.

Ad lignum putridum.

Fungi Rickiani 13526, S. Leopoldo 1932: Typus.

Var. **longispora** Rick, n. var.: Sporis 28x14 my, cylindricis
curvulis.

Ad lignum putridum.

Fungi Rickiani 22779, S. Salvador 1945: Typus (sub nomine I
longispora Rick, n. sp.)

Iola minima Rick, n. sp.

Hymenio albo, membranaceo, tenui, fisso, mucedineo. Basidiis valde curvis, septatis, 8 my latis, varie longis. Sporibus piriformibus usque sphaericis, 12-14 my.

Ad muscos.

Iola cartilaginea Rick, n. sp.

Initio disciformis, margine albo-ciliato; demum nuda, cerea, cerebriformis, crassiuscula, tenax, effusa; sicca obscura. Basidiis geniculatis, septatis, 60 my longis; saccis piriformibus, usque 20x15 my. Sporibus ovato-depressis, grosse apiculatis, usque 25x15 my. Sporibus gonidialibus 15x6-8 my.

Fungi Rickiani 20776, S. Salvador 1944: Typus.

Iola Hookeriana A. Möller, Bot. Mitt. 8 (1895) 163. — Rick, Broteria 5 (1906) 5; Egatea 18 (1933) 210.

Muscos membranose occupans, in sicco alba. Basidiis 90 my longis, cellula basali inflata. Sporibus falciformibus, 28-36x6 my.

Ad muscos.

Platyglea Schröter.

Platyglea blastomyces A. Möller, B. Mitt. 8 (1895) 163. — Rick, Egatea 18 (1933) 211.

Albo-griseo-flavescens, effusa, 5 mm crassa. Basidiis usque 200 my longis, septatis. Sporibus 12x16 my.

Ad ramos putridos.

Platyglea Peniophorae Bourd. et Galz., Hym. de Fr. I. Soc. Myc 35, 17; 36, 69.

Pallida, resupinata, ceraceo-subgelatinosa, 1-2 mm crassa; margine sicco albo; hyphis geniculatis, tenuibus. Basidiis demum rectis, triseptatis, 25-30x4-6 my. Sporibus ovatis, 5-10x4-6 my.

Ad Peniophoram sp. parasitica.

Iolae orthobasidion A. Möll. forsan varietas luxurians.

Fungi Rickiani sub Sebacina, indeterminata tamen.

Platyglea minima Rick, Egatea 18 (1933) 211.

Vitrea, gelatinosa, vix 1 mm diametro. Basidiis sterigmatibusque longissimis, filiformibus. Sporis piriformibus, subcoloratis, 7x3 my.

In Polyporo; in herbario generatim evanescens.

Fungi Rickiani 14542, S. Leopoldo 1930: Typus.

Platyglaea moriformis Rick, n. sp.

Flava, humida expallens, resupinata, applanato-moriformis, cartilaginea, 7 mm lata. Basidiis 50-100x8 my, septatis, maturis cylindricis cellulisque singulis inflatis. Sporis longe lateque apiculatis, 10-15x7-10 my.

Ad corticem.

Fungi Rickiani 20010, S. Salvador 1943: Typus.

Platyglaea Grandinia Rick, Egatea 18 (1933) 211.

Effusa, gelatinosa, membranacea, ambitu in sicco versicolore (cinereo, stramineo, flavo-rubente), setulosa, cinereo-violacea. Basidiis elongatis, septatis. Sporis 12-16x9 my, curvulis, granulis plenis.

Ad corticem.

Partibus iunioribus hyalino-griseis, nodulosis; vetustis olivaceo-luteis, sine nodulis; margine albo-tomentoso, demum subnullo.

Fungi Rickiani 14539, S. Leopoldo 1932: Typus. — 14540, S. Leopoldo, 1935. 14544, S. Leopoldo 1938.

Ductifera.

Ductifera Millei Lloyd, (Sacc. 23 (1925) 581.

Pallide brunnea, gelatinosa, cerebrina, 1-3 cm diametro. Gloeocystidiis 6-8 my latis, coloratis, epithecium formantibus. Basidiis cylindricis, dilutis. Sporis hyalinis, 12x6 my, curvulis.

Ad lignum.

Ductifera atra Rick, n. sp.

Atra, resupinata, applanata, punctato-nodoso, gelatinosa. Basidiis 20 my, piriformibus, immersis. Sporis usque 12-15 my, ova-

libus, lateraliter apiculatis. Ductibus longissimis, brunneis, rosarii-formibus. Ad lignum nudum.

Fungi Rickiani 13088, 13089, S. Salvador 1943: Typus.

Var. **macrospora** Rick, n. var.: Cartilagineo-cerea, 1 cm lata, circularis, 1 mm crassa, hispidula. Basidiis sphaericis ovatisve, cruciatis. Sporibus 16x9 μ . Ductibus longissimis, rosarii-formibus, brunneis, 1-2 μ , parce coloratis.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 23079, S. Salvador 1944: Typus.

Eocronartium Atkinson.

Eocronartium muscicola (Pers.) Fitzp., Phytopath. 8 (1918) 197. — Saccardo 23, 583.

Eocronartium typhuloides Atk., Journ. of Myc. 8 (1902) 107. — Saccardo 17, 211.

Clavaria muscicola Pers., Obs. 2. t. 3. f. 2.

Protopistillaria muscicola Rick, Egatea 18 (1933) 210, ubi *Protopistillaria* Rick, n. gen. Clavulata, perfecte pistillariiformis, 1 cm alta, 1-7 mm lata, initio alba, demum apice flavescens rubescensve, cartilaginosa, gregaria; stipite sensim in clavum transeunte, musco vivo insidente. Basidiis longitudinalibus, 10 μ crassis, maturis strictioribus, ramificatis, laxis, septatis; sterigmatibus longis, validis. Sporibus 30-50x4-8 μ , curvis, saepe falciformibus, guttulatis, hyalinis.

Vera systematis Brefeldiani Clavariaceae protobasidialis; cum lolae Hookerianae A. Möller sit identica quoad notas microscopicas, cultura probanda est distinctio.

Tjibodasia Holtermann.

Tjibodasia brunnea Martin, Lloydia 4 (1941) 262.

Pezizoidea, applanata, ceracea, flavo-brunnea (vegeta intus pallida, extus brunnea); margine pallido; sicca nigrescens; 1 cm lata. Basidiis cylindraceutis, transverse triseptatis; epibasidiis (sterig-

matibus) longis, 1,5-2,5 my crassis. Basidiosporis ellipticis ovatisve, 7-9x4-6 my, per repetitionem germinantibus.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 15208, S. Leopoldo 1939; typus in Herbario Martin.

Pilacrella Schröter.

Pilacrella delectans A. Möller, Bot. Mitt. 8 (1895) 164. — Rick, Broteria 5 (1906) 6. — **Egatea** 18 (1933) 214.

Capítulo albido, 0,75 mm diametro; stipite aquoso, 5 mm alto, tenuissimo. Basidiis 60x5-6 my, apice curvatis, septatis. Sporis asterigmaticis, 14-18x7-8 my.

In Euterpes foliis vulneribusque.

In Rio Grande do Sul a me non lecta.

Pilacre Fries.

Pilacre Petersii B. et C. — Saccardo 4,580. — Rick, Broteria 5 (1906) 6; Ann. Myc. 9 (1911) 177, fungi exs. 230; **Egatea** 18 (1933) 230. **Phleogena** decorticata (Schw.) Martin, Univ. Iowa Stud. 18 (1944) 69.

Stipite brevi, albo, 4 mm alto; capítulo maiusculo, sphaerico, 2-4 mm diametro; hyphis suberectis, anastomosantibus, ramis tortuosis. Basidiis septatis, 27-30x5 my. Sporis 6-8x5-8 my. Gonidiis globosis, pleurogenis, sessilibus.

Ad cortices.

Pilacre nivea B. et C. — Saccardo 4, 581. — Rick, **Egatea** 18 (1933) 214.

Nivea; stipite cartilagineo, glabro, nitido, subramoso; capítulo furfaraceo. Basidiis sicut in praecedente.

Ad corticem.

Cum *Pilacre* generatim in statu gonidiali inveniatur, basidia nonnisi cultura obtinentur.

Anthoseptobasidium Rick, Lilloa 9 (1943) 215.

Sicut Septobasidium, non tamen in coccideis parasiticum minusque pannosum, fere ut Corticium; coremiis prout in Auricularia auricula Judae.

Anthoseptobasidium Taquarae Rick, Lilloa 9 (1943) 215 (A. "Taquarae" mendo typographico!)

Resupinatum, membranaceum fragile, corticioideum, 1 mm crassum, a substrato facile frustulatim solubile, laxe adnatum, longe extensum, margine fimbriato, albidissimum, siccum cremeum vix rimosum, reticulatim albo-punctatum. Basidiis irregularibus, probasidiis sphaericis formatis, cylindricis, tortis, usque 80x20 my, saepe aliquid constructis, septatis. Coremiis gonidigeris in rosulam compositis ex hyphis oleo repletis, sinibus coloratis, crispis, 3-4 my latis, septatis, plurimis; rosula 1 mm alta lataque. Sporibus amygdaliformibus, maximis, usque 20x10-15 my, hyalinis.

Ad Bambusam ("Taquara" incolis) emortuam frequens.

Coremia gonidigera cum illustratione NP 1.1. (1900) 85 omnino conveniunt; ideo huic familiae novum genus adscribendum putavi, quamquam septa in basidiis, sine dubio exstantia, non viderim.

Fungi Rickiani 12166, S. Salvador 1942: Typus.

Anthoseptobasidium rhabarbarinum (Mont.) Rick, n. comb.

Septobasidium rhabarbarinum (Mont.) Bres., Ann. Myc. 14 (1916) 240. — Couch, The Gen. Sept. (1938) 122. — Rick, Broteria 35 (1930) 195; Lilloa 9 (1943) 216.

Daedalea rhabarbarina Mont., Ann. Sci. Nat. ser. 2, 13 (1840) 205.

Plagulatim super ramos extense resupinatum, corticioideum; margine albo-fibroso; valde tenax, laxe tamen contextum, ad marginem flavum, medio flavo-cremeum; hyphis subhyalinis, crispis, 3 my. Basidiis 40-60x12 my, cylindricis, septatis. Sporibus 20x3-6 my, elongatis, hyalinis, altero apice acuto, altero obtuso. Coremiis 10-13 my, subsphaericis, ramulis densis, intricatis, gonidiis minimis, in coremiis hyphisque.

Ad ramum putridum.

Fungi Rickiani 20077, S. Salvador 1943.

Anthoseptobasidium aureum Rick, (Lilloa 9 (1943) 216.

Resupinatum, crassiusculum, membranaceum, plagulis separatis concrescens, molle, lanuginosum; hyphis 3 my, hyalinis, laxe contextis, tenacibus. Basidiis varie tortis constrictisque, initio latius, cylindricis, demum angustisque, lateraliter septatis. Sporis lateralibus, albis, generatim 12x9 my, apiculatis, aliquibus rugosis. Coremiis concrescentibus, luteolis, variae magnitudinis.

Ad corticem emortuum.

Quam *A. rhabarbarinum* mollius, sporisque diversum; margine, consistentia, colore carneo-aureo etiam distinctum; attamen identitas non omnino exclusa.

Anthoseptobasidium flavo-cremeum Rick, n. sp.

Plagulis extensis resupinatum, corticioides; margine albo-fibroso; valde tenax, nudum, flavo-cremeum; hyphis subhyalinis, crispis, 3 my. Basidiis 40-60x12 my. Sporis 20x3-6 my, elongatis altero apice acutis, altero obtusis, hyalinis. Coremiis 10-30 my, subsphaericis, ramulis densis, intricatis. Gonidiis minimis, in coremiis hyphisque.

Fungi Rickiani 12200, S. Salvador 1943: Typus.

Auricularia Bulliard.

Auricularia auricula-Judae (L.) Schröter. — (Saccardo 6, 766 (Hirneola). Rick (sub *A. a. J.* (L.) Berk.), Ann. Myc. 5 (1907) 336, fungi exs. 137; Broteria 21 (1924) 139; Egatea 18 (1933) 214.

Concava, flexuosa, tenuis, 2-10 cm diametro, rubro-sanguinea; sicca atra, cornea; venoso-plicata, extus tomentosa. Sporis reniformibus, 12x4-5 my.

Ad truncos in toto orbe communissima.

Var. tremellosa (Fries) — Saccardo 6, 407.: Hymenio polyporoideo, favoso (*Poroauricularia* Llyd). Rick, Egatea 18 (1933) 215.

Var. delicata (Fries): Saccardo 6, 407. Hymenio pileoque albido (= albida Berk., crassa Lloyd). Admodum variabilis. Rick, Egatea 18 (1933) 215.

Var. polytricha (Mont.) — Saccardo 6, 766. Tomento exteriore mul-

to densiore, immo crinito, unice diversa; rarior hic, in Brasilia Centrali communis.

***Auricularia dacryomycetispora* (Speg.)**

Hirneola dacryomycetispora Speg. — Saccardo 6, 767. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 215.

Parvula, pezizaeformis, ad summum 1 cm; gelatinosa, tenax, rigida, brevistipitata, rubra vel rubro-brunnea, immo subnigra, granuloso-subpruinosa, intus atra; glaberrima, disco obliquo. Sporis 12-13x6 my, navicularibus, altero apice acutulo.

Ad truncos non raro gregaria.

Fungi Rickiani 12270, S. Leopoldo 1940. — 12252, 12255, 12256, 20276, 20606, 21047, S. Salvador 1942-1945.

***Auricularia mesenterica* (Dicks.) Fr. — Saccardo 6, 762. — Rick,**

Broteria 3 (1904) 279; *Ann. Myc.* 5 (1907) 335, fungi exs. 122; *Broteria* 21 (1924) 139; *Egatea* 18 (1933) 215.

Pileis e resupinato reflexis, integris, crassis, pilosis, fasciatozonatis, fuscescenti-cinereis, seriatim imbricatimque elongatis; hymenio costato-plicato, cinereo-fusco. Sporis oblongo-reniformibus, 13-15x4-5 my.

Ad truncos frequens.

Fungi Rickiani 12254, Sta. Maria. — 12250, 12259, 12261, 12264, 12269, S. Leopoldo 1930. — 12251, S. Salvador 1943.

***Auricularia discensa* Lloyd, *Myc. Notes* 902, pl. 139, f. 1593. Rick, *Egatea* 13 (1928) 434; *Egatea* 18 (1933) 215.**

Cerebriformis sicut *Tremella pallida*, 1-5 cm diametro. Basidiis longitudinalibus, septatis. Sporis 10x8 my, curvulis.

Ad lignum.

Septis nec a Lloyd nec a me visis.

Var. ***macrospora*** Rick, n. var.: Valde cartilaginea, humida brunnea, sicca atra, merulioidea potius quam cerebrina, ad instar *Exidia* late extensa. Sporis usque 20x15 my, ovatis.

Fungi Rickiani 20598, 20615, S. Salvador 1945: Typus.

***Auricularia brasiliensis* Lloyd, *Myc. Notes* 5 (1916-1919) 785.**

Gelatinosa, cerebriformis, succinea, 2-4 cm diametro.

Ad lignum.

Nihil aliud videtur quam *A. Auricula Judae cerebriformis*.
Fungi Rickiani 12252, S. Salvador 1943.

***Auricularia albida* (Romell) Rick, n. comb.**

Hirneola albida Romell. Bihang till Sv. Vet. Akad. Handl. 26, Afd. 3, n. 16 (1901) 45.

Tota in vegeto cremeo-ochroleuca, in sicco crenea, cupula usque 3 cm alta, 3-5 cm lata, extus pilis hyalinis, 30-120 my longis, 4, 5-8 my crassis, dense velutina; initio laevis, demum intus sparse subradiatoplicata vel costata. Sporis hyalinis, oblongo-allantoideis, 10-14x6-7 my.

Ad truncos putridos.

Fungi Rickiani 13236, S. Leopoldo 1905 (sub *Hirneola albida* Romell)

***Auricularia peltata* Lloyd, Myc. Notes 7, 1117, pl. 198, f. 2112.**

Resupinata, plagulatim effusa, gelatinosa, tenuis: margine tenui, albo; colore brunneo-atro.

Ab *A. auricula Judae* videtur distincta; forsan petrus *Phlebia*.
Fungi Rickiani 12272, Sta. Maria 1935.

***Septobasidium* Patouillard.**

Totum hoc genus secundum Couch, The Genus *Septobasidium* (1938), ubi etiam litteratura.

***Septobasidium Stevensoni* Couch, The Gen. Septob. (1938) 186. -- Rick, Lilloa 9 (1943) 194.**

Resupinatum, initio gossypinum; hymenio formato; superficie unita, tenuiter granulata; colore variabili: subiculo contextuque brunneo-subpurpureo, hymenio ochraceo-brunneo. Basidiis 4-cellularibus, cylindricis, apice crassioribus, 37-50x6-8 my. Sporis 13-17x4-5,5 my, curvato-ellipticis.

Ad corticem Citri.

Hyphis hymenii rectis, 4-5 my crassis a S. lilacino Burt distinctum, quod hyphas habet lilacinas, 2-3 my crassas, hyphasque hymenii circinnatas.

***Septobasidium Burtii* Lloyd, Myc. Notes 7, 1286, pl. 296, f. 2902.**
-- Rick, Broteria 35 (1939) 194. — Couch, The Gen. Septob. (1938) 168.

Resupinatum, brunneum, intus nigrum, juvenile griseum, his duobus coloribus in eodem strato variantibus; margine definito, albido; superficie costata, costis e centro excurrentibus; interstitiis hyphis intertextis repletis. Basidiis longe pedicellatis, stipite 2-15 my longo, ipsis basidiis 50-60x6-8 my. Sporis 21-29x4-5 my. Fungi Rickiani 19094, S. Leopoldo 1936.

Septobasidium cinereum Couch, The Gen. Septob. (1932) 123. — Rick, Broteria 35 (1939) 195.

Longe resupinatum, maxime in cortice Citri; generatim cinereum, attamen humidum etiam atrum, viridi-tinctum; hymenio formato obscuriore, hypochnoideo, irregulari, spongiiforme, sine subiculo. Basidiis cylindricis, 52-80x7 my, altero latere depresso. Sporis 13-17x5-8 my, plerumque 16x6 my.

In Citra communissimum, attamen etiam ad alias arbores.

S. fuscum, cervicolar e fumigatum similia, non vero ita irregularia, lacerata et spongiiformia.

Fungi Rickiani 19087, Sta. Maria 1936 — 19114 (?), S. Salvador 1942.

Septobasidium alveomarginatum Couch, The Gen. Septob. (1932) 158. — Rick, Broteria 35 (1939) 194.

A S. albido colore pallidiore, superficie perfecte laevi, subsplendente distinctum. Basidiis rectis, 4-cellularibus, 5-6,5x42-54 my; sterigmatibus brevibus. Sporis non visis.

Ad Citrum vivum.

Fungi Rickiani 19107, S. Salvador 1938.

Septobasidium cervicolar Couch, The Gen. Septob. (1932) 182. — Rick, Broteria 35 (1939) 195.

Resupinatum, griseo-brunneum usque brunneum; margine definito, irregulari; laeve, saepe stratosum. Basidiis 40-50x4-5 my, rectis, breviter stipitatis, max crassiusculis, 4-cellularibus; sterigmatibus brevibus. Sporis 13-4 my, ellipticis, altero apice applanatis, demum bicellularibus.

Ad corticem vivum.

Colore multo minus brunneo, basidiis sporisque minoribus a S. fumigato, etiam in Brasilia invento, distinctum.

Typus a Rick collectus in Herbario Farlow: S. Leopoldo 1929.

Septobasidium Bresadolae Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) 181. — Couch, The Gen. Septob. (1938) 103. — Rick, Egatea 18 (1933) 212; Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum, 30-40 cm et ultra extensum; colore griseo-avellaneo, demum brunneo; superficie fertili velutina; in vestusto laevigatum, immo excavatum; margine indeterminato; interdum stratosum; subiculo parum evoluto. Basidiis 36-47x8-10 my, bicellularibus, raro 3-4-cellularibus, semper tamen duabus solum cellulis sterigmaticis; sterigmatibus 8-12 my longis. Sporibus ellipticis, altero latere depresso, 6-11x13-21 my, plerumque 8x18 my.

Ad plantas scandentes in coccideis parasitans; probasidiis vacuis remanentibus.

Fungi Rickiani 19090, 19079, S. Leopoldo 1938-1939.

Septobasidium fusco-cinereum Bres., in herbario. — Couch, The Gen. Septobas. (1938) 83. — Rick, Broteria 35 (1939) 195.

S. Jamaicensi Burt. (Couch, l. c. 81) simile, tenuius tamen initioque columnis destitutum. Basidiis cylindricis, elongatis, 8-12x37-50 my, bicellularibus. Sporibus 6x25 my, basi paululum dilatatis, apice recurvis. Ad corticem super coccideas.

Fungi Rickiani 22722, S. Salvador 1945.

Septobasidium Carestianum Bres., Malpighia 11 (1897) 254. — Couch, The Gen. Septob. (1938) 155. — Rick, Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum, perenne; plagulis 1-6 cm, ovatis; generatim theobromataceo-brunneum, attamen etiam albidum nigrumve; margine pulchre albo; generatim laeve; subiculi columnis brevibus. Basidiis 34-47x4-5 my, 4-cellularibus, clavatis. Sporibus 15x4 my, curvato-ellipticis.

Ad Citri et Aleuritidis corticem vivum; Melias destruit.

Plagulis in vegeto bene definitis, hymenio laevissimo, margine albo facile distinctum; vetustum saepe nigrum rimosumque.

Fungi Rickiani 19077, 19095, 19098, 19120, Cai 1927. — 20548, S. Salvador 1945.

Septobasidium Rickii Couch, The Gen. Septob. (1938) 275. — Rick, Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum; plagulis regularibus circularibus, usque 6 cm latis; colore brunneo; hymenii superficie laevi partimque subglabra, crustosa; margine abrupte determinato, albo, 1 mm lato; contextu inferius immediate e subiculo exsurgente, crasso, spongioso; coccideis in hoc ipso strato habitantibus; columnis 1 mm altis. Basidiis sporisque ignotis.

Ad corticem Rapanaeae.

Coccideis in ipso strato habitantibus ab omnibus distinctum.

Fungi Rickiani 19127, Pinheirinho 1936. — 19063, 19068, 19112, 19115, S. Pedro 1938 (quae determinationes tamen saepius dubiae). Typus in Herbario Lloyd.

Septobasidium crinitum (Fr.) Pat. in herbario. — Couch, The Gen. Septob. (1938) 252. — Rick, Ann. Myc. 4 (1906) 311, fungi exs. 75; Broteria 5 (1906) 5; Egatea 18 (1933) 211; Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum, maxime in ramis a se deformatis; pallidum usque cremeum; columnis brunneis, altis, plurimis, ita ut hymenium quasi in aere suffultum appareat. Basidiis suberectis, 57-64x10,5-11,5 my, 4-cellularibus; sterigmatibus 20-16x5 my. Sporibus valde curvis, semicircularibus, 32x6 my.

Ad corticem Rapanaeae, a S. Rickii tamen bene distinctum.

Fungi Rickiani 19122, S. Leopoldo 1905.

Septobasidium lepidosaphis Couch. Journ. Elisha Mitchell Sci. Soc. 51 (1935) 35; The Gen. Septobasidium (1938) 146.

Resupinatum, super folia extensum, usque 6 cm²; brunneum; superficie spinosa, spinis 1 mm inter se anastomosantibus, ita ut superficies areolato-favosa appareat; margine determinato, fertili; hymenio columnis tenuibus, unitis, spinosis, suffultum. Probasidiis 8x12, generatim 9 my. Basidiis elongatis, cylindricis, etiam curvis, 4-cellularibus, 31-46x5 my; sterigmatibus tenuibus, 4 my longis. Sporibus curvato-ellipticis, 11-14x3-4 my.

Ad ramos foliaque Citri.

Fungi Rickiani 19123, S. Leopoldo 1937.

Septobasidium aligerum Patch, Trans. Brit. Soc. Myc. 12 (1927) 270. — Couch, The Gen. Septob. (1938) 110.

Resupinatum; superficie griseo-purpurea vel brunnea, colliculosa, columnis superficiem elevantibus; margine in truncis deter-

minato, in foliis indefinito; subiculo sub lente griseo-pulveraceo, columnis e subiculo numerosis, rectis, nigris, 1-1,5 mm altis; hyemenii setis prostantibus, hyalinis. Basidiis curvatis, circinnatis, 30-40x5 my, 4-cellularibus, omnibus fertilibus. Sporis curvato-ellipticis, 4-6x11-14 my.

Septobasidium alni Torrend. Broteria 11 (1913) 84. — Couch. The Gen. Septob. 1938 150.

Var. *brasiliense* Couch, The Gen. Septob. (1938) 153. — Rick, Broteria 35 (1939) 195.

Resupinatum, usque 10 cm extensum; molle, ligneo-brunneum, vetustius obscurum; laeve, subsplendens; spinis conicis, paucis; margine determinato, ciliato dentato; iuvenile cum columnis subiculi, vestustum irregulariter stratosum; subiculo crasso, compacto, brunneo-atro. Basidiis 50-60x5 my, 4-cellularibus. Sporis 20-21x3-4 my, elliptico-truncatis, pluriseptatis.

Ad Meliam aliasque arbores.

Fungi Rickiani 19080, Sta Maria 1934.

Septobasidium perforatum Couch. The Gen. Septobasidium (1938) 290. — Rick, Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum, arcte adhaerens, firmum; colore ligneo-brunneo; margine determinato, albo, angusto; superficie perforationibus ovalibus pertusa; partibus internis vix differentiatas, cum hyemenii contextu concretis. Basidiis sporisque ignotis.

Ad ramos.

S. Leopoldo; typus in U.N.C. Herb. 10395.

Septobasidium separans Couch, The Gen. Septob. (1938) 185. — Rick, Broteria 35 (1939) 195.

Resupinatum; iuvenile hyphis flocculatis pallidis resupinate corticem obducentibus praeditum; subiculo columnisque destitutum; hymenio tenuissimo, papyrino, theobromataceo-brunneo, duplicato multiplicatove. Basidiis longis, cylindricis, 46-71x5-6 my, generatim 54x5,5 my, 4-cellularibus, a probasidio deciduis tuncque generatim sporas producentibus. Sporis 15-21x4 my, aliquid curvulis, 4-cellularibus.

Ad Citrum aliasque arbores.

Fungi Rickiani 19093, S. Leopoldo. Typus in U. N. C. Herb. 10088.

Septobasidium myrsinae Couch, The Gen. Septobasidium (1938) 273. — Rick, Broteria 35 (1939) 194.

Resupinatum; superficie laevi, paucis cavitatibus non obstantibus; tactu molle; album cum maculis brunnescentibus, vel totum brunnescens; margine bene determinato, substrato arcte adpresso, ita tamen ut margo cum columnis supremoque strato tamquam ex parvis inter discis se connexis compositus appareat. Basidiis sporisque non visis.

Ad Citrum, Meliam aliasque arbores.

In litteratura Rickiana sub *S. albidum* Pat.: Ann. Myc. 5 (1907) 337, fungi exs. 157; Egatea 18 (1933) 212.

Fungi Rickiani, 19073, 19109, S. Leopoldo 1939.

SIROBASIDIACEAE.

Sirobasidium Lagerheim.

Sirobasidium Brefeldianum A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 165. — Rick, Ann. Myc. 5 (1907) 31, fungi exs. 118; Broteria 5 (1906) 7; Broteria 21 (1924) 137; Egatea 18 (1933) 285.

Gelatinosa, pulvinulis vitreis vix 3 mm diametro composita. Basidiis ovatis, lineariter unitis, bicellularibus. Sporibus sessilibus, 22-24x7-8 μ y; a basidiis separatis sphaericis.

Ad ligna.

Fungi Rickiani 14864, S. Leopoldo 1904.

Sirobasidium brunneum Lloyd, Myc. Notes 7, 1199, pl. 245, f. 2459. — Rick, Broteria 21 (1924) 137; Egatea 13 (1928) 434; Egatea 18 (1933) 285.

Brunneum, cavum, gelatinosum, e subiculo gelatinose exsurgens. Basidiis subglobois, ad apicem contractis, bicellularibus, unitis.

Ad ligna.

Fungi Rickiani 14863, S. Salvador 1940.

Patouillardina Bresadola.

Patouillardina cinerea Bres. apud Rick, Broteria 5 (1906) 7; Egatea 13 (1928) 434; Egatea 18 (1934) 213.

Effusa, margine albo aut subnullo, grisea, subgranulosa, granulis densis vel sparsis. Basidiis clavato-subfusiformibus, longitudinaliter oblique septatis; sterigmatibus longis. Sporibus 10x6 my, ellipticis, subcurvulis.

Ad ligna.

Species admodum variabilis: colore griseo, brunneo-fulvo, immo atro, etiam vitreo; margine nullo aut valde albo-lanoso; pelli-culoso-tenuissima aut crassior; saepe minute gyrose gelatinosa aut pure corticioidea.

Fungi Rickiani 14535, S. Leopoldo: Typus. — 14534, S. Leopoldo 1939. — 14536, 14537, 14538, Pareci 1942. — 20026, S. Salvador 1942.

Var. Grandinia (Rick) Rick, n. comb.

Platyglea Grandinia Rick, Egatea 18 (1933) 211.

Atractobasidium Grandinia (Rick) Martin, Mycologia 28, N. 2 (1936) 198.

Effusa, gelatinosa, membranacea, ambitu in sicco versicolore (cinereo, stramineo, flavo-rubente), setulosa, cinereo-violacea. Basidiis elongatis, septatis. Sporibus 12-16x9 my, curvulis, plenis granulis.

Ad corticem.

Partibus iunioribus hyalino-griseis, nodulosis; reliquis vetustioribus olivaceo-luteis, enodulosis; margine albo-lanoso, demum subnullo.

Fungi Rickiani 14539, S. Leopoldo 1932: Typus. — 14540, S. Leopoldo 1935. — 14544, S. Leopoldo 1938.

TREMELLACEAE**Stypella** A. Möller.

Stypella papillata A. Möll. Bot. Mitt. 8 (1895) 166. — Rick, Egatea 18 (1933) 285.

Membrana tenuissima, 0,5 mm crassa, sub lente papillata, colore vitreo, sicca alba. Basidiis 9 my diametro, 4-cellularibus; sterigmatibus 9 my longis. Sporibus 4 my, sphaericis. Inter hyphas sacculi existunt lutei, 200x10 my.

Var. **maior** Rick, n. var.: Basidiis sporisque maioribus; basidiis ex hyphis arborescentibus.

Fungi Rickiani 15254, Taquarembó 1935.

Stypella minor A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 166. — Rick, Broteria 5 (1906) 7; Egatea 18 (1933) 286.

Speciei praecedenti macroscopice identica, saccis autem longitudinalibus destituta. Basidiis 4-5 my diametro, 4-cellularibus. Sporibus ovalibus, 6x3 my.

Ad lignum putridum.

Fungi Rickiani 15252, S. Leopoldo 1936.

Stypella Grandinia Rick, n. sp.

Resupinata, granuloso-vitrea, gelatinosa, luteo-grisea, sparse minimeque vitreo-spinulosula, sicca albo-conspersa. Basidiis e hyphis delicatulis, tenuiter arborescentibus, 10 my, sphaericis, 4-cellularibus. Sporibus 8x5 my.

Ad lignum putridum.

Vera *Grandinia tremelloidea*, S. minori similis.

Fungi Rickiani 15256, 12491, 21610, 22839, 22896, S. Salvador 1942-1944.

Exidiopsis Olsen.

Exidiopsis cerina A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 167. — Rick, Egatea 18 (1933) 343.

Effusa, tenuis, cinerea, ceracea, laevis, glabra. Basidiis ovalibus, 12 my diametro. Sporibus curvulis, 8-9x6 my. Saccis (cellulis elongatis) fuscidulis, parallelibus, 23-30x7 my.

Fungi Rickiani 13055, 13035, 13059, 20018, 20164, 20281, S. Salvador 1943.

Exidiopsis fuliginea Rick, Broteria 5 (1906) 8; Egatea 18 (1933) 344.

Resupinata, tenuissima, margine indeterminato, fuligineo-ci-

nerea vel atra, fere glabra, subgelatinosa. Basidiis 10-15 my 4-cellularibus. Sporibus curvulis, apiculatis, 12x4-5 my.

Ad lignum decorticatum.

Fungi Rickiani 13045, 13042, S. Leopoldo 1930-1940. — 13046, Sto. Amaro 1935. — 13062, Pinhal (Sta. Maria) 1936. — 13030, 20460, S. Salvador 1943.

Exidiopsis Mölleri Rick, *Egatea* 18 (1933) 344.

E. verruculosae simillima, hymenio tamen setuloso verruculosoque. Sporibus 12x8 my, curvulis.

Ad ligna.

Fungi Rickiani 13039, S. Leopoldo 1931: Typus. — 13053, 13057, S. Salvador 1938-1943.

Exidiopsis ciliata A. Möll. Bot. Mitt. 8 (1895) 168. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 344.

Effusa, alba, plagulas rotundas irregularesve formans, 2 mm crassa, cartilaginosa, margine eximie fimbriata, papillata. Basidiis 12-14 my, 4-cellularibus. Sporibus 12-15x6 my, curvulis.

Ad corticem.

Fungi Rickiani 13032, S. Leopoldo. — 13032, S. Salvador 1943.

Exidiopsis glabra A. Möll. Bot. Mitt. 8 (1895) 168. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 343.

Effusa, laevissima, tenuissima, viscosissima, tenerrima, indeterminata. Basidiis 18x12 my. Sporibus 12x10 my.

Ad corticem.

Fungi Rickiani 12067, S. Leopoldo 1936. — 13054, S. Salvador 1942.

Exidiopsis tremellispora A. Möll. Bot. Mitt. 8 (1895) 168. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 343.

Effusa, ceracea, subgelatinosa, mollis, cinerea, hirsutula; saccis longitudinalibus fuscidulis, maioribus. Basidiis conico-sphaericis, 20-22 my. Sporibus 6x11 my, piriformibus.

Ad corticem.

Var. **macrospora** Rick, n. var.: Sporibus 18x24 my, piriformibus; sine saccis.

Fungi Rickiani 20569, S. Salvador 1946: Typus varietatis. 13028.

13040, 13044, S. Leopoldo 1931-1932. — 13029, 13041, 13050, 13055, 13056, 20122, 22547, S. Salvador 1942-1943.

Exidiopsis verruculosa A. Möll., Bot. Mitt, 8 (1895) 163. — Rick, Broteria 5 (1906) 8; Egatea 18 (1933) 343.

Effusa, tenera, papyro tenuissimo similis, indeterminata, alba, tenuissime papillata. Basidiis 10 my, 4-cellularibus; sterigmaturibus 10 my longis. Sporis subcurvulis, 9-10x4 my.

Ad ramos putridos.

Fungi Rickiani 13031, 13038, 13048, 13066, 13070, S. Leopoldo 1930-1932. — 13052, 13064, 20437, 20567, 22738, 22971, S. Salvador 1939-1945.

Exidiopsis rufula Rick, n. sp.

Sicut *E. verruculosa*, colore tamen verruculisque rufis; basidiis maioribus, 14x10 my.

Fungi Rickiani 22671, S. Salvador 1945: Typus.

Exidiopsis albo-pruinata Rick, n. sp.

Tenuis, effusa, luteo-atra, albo-pruinosa, gelatinosa; margine fimbriato; ductifera, ductis longis, undulatis, saepe fractis, 3-4 my latis, intus granulosis, luteis. Basidiis piriformibus, 10-12 my, 4-cellularibus. Sporis 6-11x6-9 my, curvulis, apiculatis.

Ad corticem.

E. cerinae similis attamen margine, ductis angustis pruinaque distincta.

Fungi Rickiani 13067 S. Leopoldo 1932: Typus. — 13071 S. Leopoldo 1932.

Exidiopsis cartilaginea Rick, n. sp.

Corticoides, immarginata, scruposa, setulosa, cartilaginea, vitrea, subcrassa, nodulosa, Basidiis 50-60x30 my, pedicellatis, 4-cellularibus. Sporis 15-30x20 my, ovalibus, apiculatis.

Ad lignum nudum.

Propter gloeocystidia forsan melius *Seismosarca*.

Exidia Fries.

Exidia succinea A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 169. — Rick, Broteria 5 (1906) 8; Egatea 18 (1933) 344.

Plano-convexa, 1 cm diametro, gelatinosa, succinea; intus saccis longis flavis percursa, 66-80x6-8 my. Basidiis 10-12 my. Sporis curvulis, 10-12x4-5 my.

E cortice erumpens.

Exidia glandulosa (Bull.) Fries. — Saccardo 6, 773.

Effusa, subapplanata, crassa, unaulata, nigricans, papillis conicis spiculosa, subtus cinerea, subtomentosa. Sporis oblongis, curvatis, hyalinis, 12-14x4-5 my.

Fungi Rickiani 12984, S. Leopoldo, 1905.

Exidia vitrea Rick, n. sp.

Resupinata, gelatinosa, aliquid gyrosa, colore vitreo, delicata, discis parvis, 3 mm latis, composita. Basidiis 9 my, globosis, 4-cellularibus; sterigmatibus longis. Sporis 9x4,5 my, altero latere saepe depresso.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 12981, S. Leopoldo: Typus.

Exidia parvula Rick, n. sp.

Vitrea, pulvinata, 1-2 mm lata, gelatinosa. Basidiis sphaericis, 30 my latis, 4-cellularibus. Sporis humidis 18 my, sphaericis.

Fungi Rickiani 22773, S. Salvador 1945: Typus.

Sebacina Tulasne.

Sebacina spinulosa (B. et C.) Burt., Ann. Miss. Bot. Gard. 2, 747.

Effusa, cartilaginea, livida, sicca rubro-carnea, raduloidea, tenacissima; margine tenui albo; grosse sparse setulosa. Basidiis sphaericis, 4-cellularibus, 30x25 my. Gloeocystidiis 9 my latis, longissimis, acutis, coloratis. Sporis cylindricis sphaericisve, apiculatis, 15-25x16my.

Ad lignum putridum.

Vix ab *Eichlerliella Kmetii* Bres. diversa; est enim nec bona *Sebacina*, nec bona *Hirneolina*.

Sebacina sebacea (Pers.) Neuhoﬀ

Thelephora sebacea Pers. — Saccardo 6, 540.

Effusa, carnosio-ceracea, indurescens, incrustando versiformis, tuberculosa, vel stalactitia, vel laevis, alba; ambitu similari; hymenio in sicco collabente, flocculoso-pruinoso. Basidiis globosis, demum interdum fissis (cruciatis). Sporibus ovato-reniformibus, granulosis, hyalinis, 10-12x6-8 μ .

Ad thallium funginum vetustum; etiam ad calceamentum vetustum.

Fungi Rickiani 20405, S. Salvador 1943.

Sebacina atra Rick, n. sp.

Resupinata, applanata, punctato-nodosa, atra, gelatinosa. Basidiis 20 μ , apiculatis. Sporibus usque 12x15 μ , ovalibus, lateraliter apiculatis. Gloecystidiis longissimis, 2,5 μ , rosariiformibus.

Ad lignum nudum.

Fungi Rickiani, 13088, 13089, S. Salvador 1943: Typus.

Var. ***macrospora*** Rick, n. var.: Cartilagineo-cerea, 1 cm lata, circularis, 1 mm crassa, hispidula. Basidiis sphaericis ovatisve, cruciatis, 16 μ . Gloecystidiis longissimis, rosariiformibus, 1-2 μ , parce coloratis. Sporibus 16x9 μ .

Fungi Rickiani 23079, S. Salvador 1943: Typus (sub *Ductifera*).

Sebacina argillacea Rick, n. sp.

Effusa, incrustans; margine minute albo, arachnoideo; albo-argillacea, straminea; in sicco rimosa; laeviuscula, sine setis visibilibus.

Gloecystidiis cylindricis, 40-60x9 μ , obtusis, luteo-farctis, fere sessilibus. Basidiis 30x16 μ , pedicellatis, demum in 2-4 cellulas separatis; sterigmatibus longis, 4 μ latis. Sporibus 15 μ , apiculatis, hyalinis.

Ad corticem.

Forma adest opalea, basidiis sphaericis, 10-15 μ latis, sporibus 9x6 μ , cylindricis vel ovalibus.

Fungi Rickiani 13733, S. Leopoldo 1939: Typus.

Sebacina livescens Bres. Saccardo 16, 183.

Effusa, ceraceo-carnosa, subglutinosa, superficie granuloso-tuberculata; ambitu similari; e pallido subalutacea, siccitate collapsa coloreque livido tincta. Basidiis ellipticis, cruciatis, 15-18x11-12 my, 2-4-sterigmaticis. Sporis hyalinis, reniformibus, 13x6-8 my. Hyphis subhymenialibus 3 my latis.

Ad truncos.

Fungi Rickiani 20995, S. Salvador 1944.

Sebacina rosea (Rick) Rick, n. comb.

Ductifera rosea Rick, Egatea 18 (1933) 345.

Globosa, 0,5 cm lata, glandulosa, gelatinosa, brunneo-rosea. Basidiis 12-15 my, hyalinis. Gloeocystidiis capitatis, piriformibus, brunneis. Sporis 10x8 my, hyalinis.

Ad ramos.

Fungi Rickiani 13090. Sto. Amaro 1935: Typus (sub Ductifera).

Sebacina tenuissima Rick, n. sp.

Resupinata, ligno innata, tenuissima, immarginata, coriacea, luteo-carnea, vel isabellina, tenuissime furfuracea. Basidiis breviter pedicellatis, 15-40-x12-15 my, piriformibus, raro seroque septatis.

Sporis 12-15 my, ellipticis (humidis curvulis maioribusque). Basidiis crusta luteo-brunnea coopertis.

Ad ligna.

Fungi Rickiani 20103, S. Salvador 1943: Typus.

Sebacina fugacissima Bourd. et Galz. — Saccardo 21, 452 (Exidiopsis).

Effusa, gelatinosa, hyalina, tenuissima, siccando evanescens; in sectione 60-70 my crassa, strato tenui basali hyphis substrato parallelis composita, ex qua hyphae fertiles, erectae, laxe dispositae, 1-1, 5 my diametro metientes, genicula numerosa ferentes (clamp connections), infra ramosae, supra tortuosae (propter proliferationem lateralem ad genicula) oriuntur. Probasidia subglobosa, hyalina, 5-6x4,5-5 my, divisione longitudinali 2-4-cellularibus. Epibasidiis subulatis usque cylindricis, sinuosis, 1-1,5 my diametro, usque 10 my longis. Sporis curvato-cylindricis, 5-5,5x2,5-3,5 my, per repetitionem germinantibus.

Ad lignum deciduum decorticatum.

Sebacina luteo-straminea (Rick) Rick, n. comb.

Gloeocystidium luteo-stramineum Rick, Broteria 30 (1934) 46.

Effusa, membranacea, margine similari, luteo-straminea, inaequalis. Cystidiis 40x10-12 my, cylindricis, apice obtusis, subclavatis, laevibus, coloratis. Basidiis magnis, subsphaericis, demum 4-cellularibus.

Sporis 9x7 my, piriformibus.

Ad Guareae Lessonianae Juss. ramum siccum.

Fungi Rickiani, 14773, 20030, 20059, 20421, S. Salvador 1943-1944.

Sebacina sordide-alba (Rick) Rick, n. comb.

Aleurodiscus sordide-albus Rick, Broteria 30 (1934) 166.

Effusa, tenuis, rudis, sordide alba, in sicco rimosa. Basidiis brevibus, latis, clavatis vel rectangularibus, 12-18 my latis; dendrophysibus laxe ramosis, crystallis fuscis botryose occupatis. Sporibus sphaericis vel piriformibus, grosse apiculatis, 8-12x8-9 my.

Ad corticem.

Gloeocystidia adsunt 4 my lata, longa, lutea, demum cum crystallis exsudatis luteis; dendrophyses in diagnosi notatae forsan gloeocystidia vetusta. S. rimosae Jacks. et Mart. forsan identica.

Fungi Rickiani 20062, S. Salvador 1943.

Sebacina luteo-cinerea (Rick) Rick, n. comb.

Gloeocystidium luteo-cinereum Rick, Broteria 30 (1934) 46.

Effusa, tenuis, ceracea, velutina, initio grisea, dein exsiccando sordide lutea, margine leviter pruinoso. Gloeocystidiis subhyalinis coloratisve, guttis oleosis magnis plenis, longis, 7 my latis, laevibus. Basidiis rectangularibus ovatisve, 20-30x15-20 my. Sporibus 8-11x8-9 my, apiculatis, piriformibus, hyalinis.

Ad corticem.

Conf. S. Pini Jacks. et Mart., et Bourdotia cinerella Bourd.

Fungi Rickiani, 13732, 13734, 13735, 20215, 20491, 20698, 20928, 22336, 22874, 22913, 23128, S. Salvador 1943-1945.

Sebacina epigaea (B. et Br.) Bourd. et Galz., Hym. de Fr. (1927)

39.

Tremella epigaea B. et Br. — Saccardo 6,785.

Late effusa, arcte adnata, tenuissime subcrustaceo-farinacea, ambifu similari, pallide cinerea, canescens. Sporibus obovatis, hyalinis, 12x7-8 my.

Ad corticem.

Fungi Rickiani, 19266, 19272, S. Leopoldo.

Hirneolina Patouillard.

Hirneolina incarnata Bres. — Saccardo 17, 208. — Rick, Egatea 18 (1933) 288.

Coriacea, solida, subresupinata, secedens; hymenio luteo-pulverulento, tactu fuscescente, demum roseo-carneo; margine albo-fimbriato; tuberculosa. Basidiis 20x10 my, 4-cellularibus. Sporibus curvulis, 10-15x8 my, hyalinis.

Ad corticem.

Fungi Rickiani, 13604, S. Leopoldo 1935. — 13617, Bagé 1936. — 13603, 13602, 13615, 13619, Parecí 1930-1941. — 13610, 20841, 20842, S. Salvador 1943-1944.

Var. **luteo-flava** Rick, Egatea 18 (1933) 288: Sporibus 15-20x10-12 my.

Heterochaete Letendreana (Pat.) Rick eadem forsán species, setulis tamen granuliformibus.

Fungi Rickiani, 13609, 22800, S. Salvador 1943-1945.

Hirneolina amoena (Lév.) Bres. — Rick, Egatea 18 (1933) 343.

Stereum amoenum Lév. — Saccardo 6,580.

Pileo coriaceo, conchato-effuso, hirsuto, opaco; hymenio pulverulento, lilacino, 1-2 cm lato. Basidiis ovatis, 4-cellularibus. Sporibus ovatis cylindricisve, 11-15x7-10 my.

Ad corticem.

Perfecte stereiformis, nullo modo gelatinosa; ideo ab antiquis inter Sterea recensita.

Fungi Rickiani, 13606, S. Leopoldo 1939. — 20502, 20562, 20618, 2020640, 20956, S. Salvador 1943-1945.

Hirneolina luteo-mollis Rick, n. sp.

Resupinata; margine parco, laevi; lutea, mollis, sicca expallens. Basidiis luteis, 15-20x10 my, 4-cellularibus; sterigmatibus longissimis; cystidiis hyalinis, longissimis, lageniformibus, nec prostantibus; hyphis tenuissimis. Sporibus 2x9 my, apiculatis.

Ad lignum.

An Sebaciae catceae (Pers.) Bres. varietas?

Fungi Rickiani, 13614, Sta. Maria 1936; Typus. — 13612, 13613, S. Salvador, 1943.

Heterochaete Patouillard.

Heterochaete hymenochaetoides Rick, *Egatea* 18 (1933) 288.

Effusa, livido-carnea, rigida, margine albo-fimbriato; sicca luteo-avellanea, sordescens; setulis sparsis, rigidis, hymenochaetoides, tenuissimis, obtusis, coloratis. Basidiis 12x10 my, 4-cellularibus. Sporis 10-15x10 my, curvulis, apiculatis.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 13588. S. Leopoldo 1932: Typus. — 13596, 13602, 22916, S. Salvador 1943-1944.

Heterochaete delicatula Rick, *Egatea* 18 (1933) 286.

Resupinata, tenuis, margine albo-lanoso; hymenio hyalino, livido, tenuissimo; setulis sparsis, minimis, incis, albis. Basidiis clavatis brevibus, crassis, 4-cellularibus. Sporis 10-15x9 my.

Ad lignum nudum.

Forma adest sporis 20-30x8, curvulis.

Fungi Rickiani. 20094, 20129, 20728, 22961. S. Salvador 1943-1944.

Heterochaete mucedinea Rick, n. sp.

Papyracea, resupinata, tenuis, tenax, aspectu mucedineo, griseo-plumbea; farinosa, dissecta, setulosa, margine dilute hyalino; epitheliis (setulis) 0,5 mm longis. Basidiis 12x8 my, numerosis, 4-cellularibus. Sporis 12x8 my, cylindricis, depressis, apiculatis.

Ad caulem *Helianthi*.

Fungi Rickiani 20829, S. Salvador 1944: Typus.

Heterochaete livido-fusca Pat. — Saccardo 11,145. — Rick, *Broteria* 5 (1906) 8. — Ann. Myc. 5 (1907) 31. fungi exs. 112. — *Egatea* 18 (1933) 286.

Resupinata, incrustans, adnata, saepe submembranacea. crassiuscula, late effusa, coriacea, gelatinosa, cinereo-fusca aut pure fusca; margine lato, albo-villoso, membranaceo; setulis sparsis, obtusis; hymenio pruinoso. Basidiis ovato-clavatis. Sporis ovoideis, subrectis, 12-18x10-14 my.

Ad corticem frequens.

Var. *glauca* Rick, *Egatea* 18 (1933) 286: Glauca, sicca, sporis 10-16x6-9 my.

Fungi Rickiani 13580, S. Leopoldo 1929. — 13573, 13578, 13598, 13599, 20098, 20519, 20892, 22697, 22854, 22939, 23165, S. Salvador 1942-1945.

Var. *pauciseta* Bres.

Rick, Egatea 18 (1933) 286.

Flavescens, setulis paucis; ad Bambusam.

Var. *grisea* Rick, Egatea 18 (1938) 286.

Cinerea, demum fumosa; sporis 14-17x7-8 my.

Fungi Rickiani, 20106, 20163, 23163, 23163, S. Leopoldo 1930-1939.
13593, 13601, 20349, 20359, 22602, S. Salvador 1943-1944.

Var. *flavo-straminea* Rick, Egatea 18 (1933) 286.

Colore stramineo, sporis 14-15x9 my.

Var. *echinospora* Rick, Egatea 18 (1933) 286. *(as Echinospora)*

Glauca, sporis 10-15x10 my, membrana scabriuscula.

Fungi Rickiani, 13546, 20102, S. Salvador 1943.

Var. *sanguinea* Rick, n. var.

Griseae similis, colore tamen in vegeto sanguineo.

Fungi Rickiani 19674, S. Salvador 1939: Typus.

Fungi Rickiani (sine varietatum distinctione), 13553, 13562, Pareci 1935. — 13570, 13574, 13575, 13594, 13600, 20202, 20415, 22747, 22872, S. Salvador 1940-1945. — 13585, 13592, S. Leopoldo 1929. — 21151, Tupandi 1945.

Heterochaete livida Pat. — Saccardo 11,144 — Rick, Egatea 18 (1933) 287.

Resupinata, tenuis, livido-ochracea, in sicco rugosa; in vegeto livida, plus minus sinuosa, margine rufulo; setulis rigidis, crassis, difformibus, in soros congestis; interstitiis laevibus, glabriusculis. Sporis hyalinis, 12-14x5-6 my.

Ad ramos.

Sporis numquam tam angustis uti apud Patouillard.

Fungi Rickiani, 13564, 13566, Pareci 1935. — 13571, 13572, Sta. Maria 1936. — 13568, 20612, 20749, 20952, S. Salvador 1939-1945.

Heterochaete ochracea Pat. — Saccardo 11,145.

Var. *lanosa* Rick, nov. var.

Resupinata, arcte adnata, margine lanoso-albo; hymenio sordide stramineo, pulverulento; setulis sparsis, initio arachnoideotectis, demum in medio stramineis, brevibus, acutis. Sporis 10-15x6 my.

Ad ramos.

Var. *kneiffiopsis* (Pat.) Rick, Egatea 18 (1933) 287.

Heterochaete Kneiffiopsis Pat. — Saccardo 11, 145.

Livido-alba, farinacea, sporis 5-9x5-7 my.
Fungi Rickiani 13585, S. Salvador 1939.

Var. **luteo-fuliginea** Rick, Egatea 18 (1933) 287.
Luteo-fuliginea, sporis 8-13x8 my.

Var **albida** (Pat.) Rick, Egatea 18 (1933) 287.

Heterochaete albida Pat. — Saccardo 11, 145.

Fungi Rickiani, 13590, 13595, S. Salvador 1943.

Fungi Rickiani (sine varietatum distinctione). 13586, S. Leopoldo 1930. — 23131, S. Salvador 1945.

Heterochaete Stae Catharinae A. Möll. Bot. Mitt. 8 (1895) 167.

Rick, Egatea 18 (1933) 287 — **H. Stae Catharinae** var. **riograndensis** Rick.

Plagulis albis, sparsis, minute membranaceis; margine delicato, sterili; spinulis sparsis, minutis, tomentosis, albis vel flavidulis. Sporis 10-16x10 my, curvulis, obtuse valideque hyalino-apiculatis. Ad corticem; etiam griseola.

Var. **delicatula** Rick, n. var.

Sporis 20-30x8 my, obtusis, apiculatis.

Fungi Rickiani 13582, S. Leopoldo 1931. — 13577, Cai 1937.

Var. **intermedia** Rick, n. var.

Tenax, setulis difficulter visibilibus, intus luteis. Basidiis usque 30x15 my. Sporis sphaericis, 8-11 my, apiculatis.

Ad lignum decorticatum.

Heterochaete gelatinosa (B. et C.) Pat. — Saccardo 11, 144. — Rick, Broteria 21 (1924) 137; Egatea 18 (1933) 288.

Kneiffia gelatinosa B. et C. — Saccardo 6, 510.

Vitrea, crassa, undata, gelatinosa, granulosa, setulosa; sporis 8-10 my, ovato-elongatis.

Fungi Rickiani 13579, Montenegro 1942.

Heterochaete Letendreana (Pat.) Rick, Egatea 18 (1933) 288.

Thelephora Letendreana Pat. — Saccardo 6, 541.

Membranacea, tenuis, subpulveracea, albida, centro brunnea vel rosea, orbicularis, confluens, resupinata. Basidiis capitatis, lon-

gitudinaliter septatis. Sporis reniformibus, hyalinis, curvulis, 10-13x10 my.

Ad corticem.

In meo specimine adsunt setulae granuliformes.

Fungi Rickiani 13549, S. Leopoldo 1929.

Heterochaetella Bourdot.

Carnosula, laxe contexta sicut *Stypella*; basidiis 4-cellularibus; cystidiis sphaericis, coloratis; gloecystidiis longis.

Heterochaetella alba Rick, n. sp.

Resupinata, submembranacea, ceracea, mollis, laxe contexta, farinosa, alba; fructificatione in dente microscopico ex axi centrali exurgente.

Basidiis stipitatis; capitulo sphaerico, 12 my lato, 4-cellulari, acute longaeque sterigmatico. Cystidiis stipitatis, capitato-stellatis, spinosis, 10 my longis, luteis. Sporis 6-9x6-7 my, ovatis.

Ad lignum.

Relate ad genus vide speciem sequentem; basidiis consistentiaque *Stypellae* proxima.

Heterochaetella dubia (Bourd. et Galz.) Bourd., Soc. Myc. 25, 30.

Heterochaete dubia Bourd. et Galz. — Saccardo 21, 449.

Effusa, corticioidea, lutescens, ceracea, margine farinoso, iam vegeta minute rimosa; setulis ex hypharum fasciculis 4 my latis laxe compositis, obtusis, relative latis; media hypha maiore, crasse tunicata; apice prostantibus divergentibusque; textura retiformi, hyalina. Basidiis longis, tenuissime pedicellatis, apice globosis, 10 my latis, demum 4-cellularibus; sterigmatibus initio crassis, dein tenuibus; cystidiis capitatis, longe pedicellatis, brunneis vel hyalinis, 5-20 my, sphaericis, valde spinosis. Sporis 5-8x4-7 my, attamen etiam sphaericis.

Ad corticem.

Determinavit Martin. — Attamen cystidia capitata, spinosa cum auctoris diagnosi non convenire fateor. Meo sensu forsan *Pseudasterodon*, tremelloideum, novum, quod tamen cystidiis, denticulis

basidiisque Stypellae valde proximum. Quibus de causis forsan etiam novum genus.

Gloeocystidia longa, farcta, hyalina, 7 my lata, cylindrica.

Fungi Rickiani 19937. S. Leopoldo 1929. — 13742. S. Leopoldo 1939. — 22751, S. Salvador 1944.

Tremella Dillenius.

Tremella brasiliensis (A. Möll.) Lloyd, Myc. Notes 7, 1152, pl. 214. f. 2239. Rick, Broteria 21 (1924) 138; Egatea 18 (1933) 345.

Tremella lutescens Pers. forma **brasiliensis** A. Möller, Bot. Mitt. 8 (1895) 169.

Cerebriformis, rubra, applanata, laevis, e ligno erumpens, 1-2 cm diametro. Sporis albis, 12-15 my, hyalinis.

Ad corticem, maxime Baccharidis dracunculifoliae DC.

A T. lutescente europaea forma applanata, consistentia compactiore, colore maxime in vetusto dilutiore distincta.

Fungi Rickiani 15116, Sta. Maria 1939. — 15105, 20195, 15102, S. Salvador 1943-1946.

Tremella fibulifera A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 170. — Rick, Broteria 5 (1906) 9; Egatea 18 (1933) 346.

Cerebriformis, flaccida, alba, lobis inflatis, 1-4 cm diametro; mox deliquescens. Basidiis 12-16 my diametro. Sporis ovalibus, 7x10 my.

Ad corticem.

Deliquescentia facile distincta.

Fungi Rickiani 15101, S. Leopoldo 1940.

Tremella ater-globosa Lloyd, Myc. Notes 7 (1922) 1148, pl. 212, f. 2220.

Rick (semper sub“atro”-globosa), Broteria 21 (1924) 138; Egatea 13 (1933) 434; Egatea 18 (1933) 347.

Globosa, parce cerebriformis, atra, subvinosa, gelatinosa, usque 1 cm diametro, subcompacta, aliquando caespitosa. Basidiis brunneis, 20 my diametro. Sporis globosis, humidis 10 my. Sporis gonidialibus brunneo-atris.

E cortice erumpens, frequens.

Intus colore brunneo intermixto, quapropter forsan melius Exidia.

Fungi Rickiani 21880, S. Leopoldo. — 15120, Sta Maria 1935. — 15111, 15114, 15104, 20049, 20275, 20451, 22661, 22708 S. Salvador 1942-1944.

Tremella fuciformis Berk. — Saccardo 6,782. — A. Möller, Bot. Mitt. 8 (1895) 170. — Rick, Broteria 3 (1904) 279; Broteria 21 (1924) 138, *Egatea* 18 (1933) 346.

Pure albq, caespitosa, 2-10 cm diametro, repetite lobata, intricata, tenuissima, tremula, gelatinosa, ad basin saepe chromo-flava. Basidiis 9-12 my. Sporis 5-7 my, sphaericis.

Ad truncos.

Fungi Rickiani 15107, S. Leopoldo 1907.

Tremella auricularia A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 170. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 346.

A *T. undulata* Hoffm. solum germinatione distincta: gonidia non immediate ex sporis, sed e salientis a sporis productis nascuntur.

Sporis 10-12 my.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 15108, S. Leopoldo 1905.

Tremella anomala A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 171. — Rick, Broteria 21 (1924) 139; *Egatea* 13 (1928) 434; *Egatea* 18 (1933) 346.

Cerebriformis, sordite lutea, 0,5-1 cm diametro, gelatinosa. Basidiis 10 my. Sporis 6 my.

Ad corticem.

T. brasiliensi similis, attamen magis brunneo-flava.

Fungi Rickiani 15103, S. Salvador 1942.

Tremella Patouillardi Sydow — Saccardo 17, 205. — Rick, *Egatea* 18 (1933) 347.

Cava, globoso-depressa, albido-luteola, sparsa vel aggregata, laevis, 3-8 mm lata. Basidiis profunde insertis, ovatis, 20-58x8-10 my; sterigmatibus oblongis, subulatis. Sporis ovatis, 7-8x6 my, hyalinis.

Ad lignum.

Fungi Rickiani 20371, S. Salvador 1943.

Tremella compacta A. Möller. Bot. Mitt. 8 (1895) 170. — Rick, Broteria 5 (1906) 9; Broteria 21 (1924) 138; Egatea 18 (1933) 345.

Anguste cerebriformis, compacta, cartilaginosa, non tamen gelatinosa, 2-4 cm diametro, colore pallide flavo. Basidiis 12-14 my, 4-cellularibus. Sporibus ovalibus, 6-7 my.

Ad corticem putridum, semel ad Stereum.

T. mycophaga Martin comparanda.

Tremella carneo-alba Lloyd, Myc. Notes 6 1051, pl. 180, f. 1954.

Resupinata, gyrosa, 6 mm diametro, gelatinosa, griseo-brunnea, vinoso-tincta. Basidiis piriformibus, 20 my latis. Sporibus elongatis, hyalinis, 20x16 my.

Ad lignum.

T. roseo-tincta Lloyd comparanda.

Aspectu a *T. brasiliensi* et *T. lutescente* non multum diversa, colore tamen in roseum vergente sporisque evidenter alia.

Tremella vinoso-tincta Rick, n. sp.

Resupinata, gyrosa, 6 mm diametro, gelatinosa, griseo-brunnea, vinoso-tincta. Basidiis piriformibus, 20 my latis. Sporibus elongatis, hyalinis, 20x16 my.

Ad lignum.

T. roseo-tincta Lloyd comparanda. Aspectu a *T. brasiliensi* et *T. lutescente* non multum diversa, colore tamen in roseum vergente sporisque evidenter alia; etiam *T. fuciformi* similis, lobis tamen angustioribus multoque crassioribus distincta. Sporibus ab *Exidia candida* diversa.

Fungi Rickiani 15113, S. Salvador 1942: Typus.

Tremella inflata Fries. — Saccardo 6,781. — Rick, Egatea 18 (1933) 347.

Maxima, 1-8 cm lata, usque 4 cm alta, lobis turgidis, inflatis, obtusis, contortis, pallide brunneis, postice inferius in corpus solidum conrescentibus. Sporibus ellipticis.

Ad lignum.

Color *A. auriculae* Judae.

Fungi Rickiani, 15109, 15116, S. Leopoldo.

Tremella fusca Lloyd, Myc. Notes 5, 683, f. 1021. — Rick, Egatea 18 (1933) 347.

A *Tremella* basi fibrosa basidiisque omnibus aequae altis distincta. Genus Romulo Zanchi collectori dedicatum.

***Zanchia Sanctae-Mariae* Rick, n. sp.**

Hyalina, parce gyrosa, caespitosa, 1-2 cm lata atque, corneo-gelatinosa. Basidiis longisterigmaticis, 10-12 my, ovalibus, 4-celularibus. Sporibus sphaericis, 8-9 my.

Ad ligna.

Basi fibroso-fusca, coriacea, substipitata egregie distincta. *Naematelia encephala* Lloyd, Myc. Notes 7, 1149, comparanda.

Fungi Rickiani 14858, Sta. Maria 1936: Typus.

***Zanchia marmorata* (B. et C. Rick, n. comb.**

***Tremella marmorata* B. et C. — Saccardo 6, 784.**

Magna, cerebriiformis, compacta, granulata, nigra, intus marmorata, sporibus oblongis.

Ad corticem.

In vegeto vitrea. Iam Berkeley *Naemateliae* habitum notat nihil tamen de subiculo fibroso vix in stipitem evolutum dicit. In vegeto potius setulosa. Determinatio dubia.

***Tremellodon* Persoon.**

Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers. — Saccardo 6, 479. — Rick, Broteria 5 (1906) 9. — Broteria 21 (1924) 138; Egatea 18 (1933) 348.

Linguiforme, sessile substipitatumve, vitreum, gelatinosum, dentatum, 1-8 cm altum, 0,5-3 cm latum. Basidiis 10-12 my, 4-celularibus. Sporibus subsphaericis, 4-6 my.

Ad lignum putridum.

Quam in Europa rarius minusque.

Tremellodon cartilagineum (A. Möll.) Rick, Egatea 18 (1933) 348.

Protohydnum cartilagineum A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 173.

Effusum, latum, cartilagosum, pallide flavum, dentibus 5x3 mm, obtusis, crassis. Basidiis 15x9-10 my. Sporibus 9x4 my.

Hyaloria A. Möller.

Hyaloria Pilacre A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 173.

Stipitata, stipite 2 cm alto, 4 mm lato, cartilaginea, vitrea; capitulis incrassatis. Basidiis 14 my, hyphis deliquescentibus tectis.

Sporis 7 my.

Placa vix stiptata, basidiis inverse conicis, 4-cellularibus, 16x12 my; an nova species? *

Fungi Rickiani 20496, 22955, S. Salvador 1945.

Protomerulius A. Möller.

Protomerulius brasiliensis A. Möll., Bot. Mitt. 8 (1895) 172. — Rick, Egatea 18 (1933) 349.

Resupinatus, margine albo-fimbriato; hymenio venis percurso; tenuis. Basidiis 7-8 my. Sporis ovalibus, 4-5 my.

Non legi.

Protomerulius Richenii Rick, An. Myc. 9 (1911) 176, fungi exs. 219; Broteria 21 (1924) 138; Egatea 13 (1928) 434; Egatea 18 (1933) 349. **Exidia Richenii** (Rick) Lloyd, Myc. Notes 7, 1229.

Vitreus, membranaceo-gelatinosus, costis merulioideis percursus, setulosus, a substrato facile separabilis. Basidiis globosis, 16 my. Sporis 7,5x4, 5-6 my, curvis, basi apiculatis.

Ad ligna.

Protoradulum Rick, Egatea 18 (1933) 348.

Radulum tremelloideum, basidiis 4-cellularibus.

Protoradulum ceraceo-vitreum Rick, Egatea 18 (1933) 348.

Ceraceo-carnosum, molle, dentibus coalitis, obtusis, hirsutis; 1 cm latum, 7 mm crassum, vitreo-hyalinum. Basidiis pedicellatis, 10-12 my latis, 4-cellularibus. Hyphis hyalinis, 7 my latis. Sportis 5-6x4 my, subpiriformibus, hyalinis.

Ad lignum putridum.

Cf. Protohydnum lividum Bres.

DACRYOMYCETACEAE.**Ceracea Cragin.****Ceracea Rickii** Bres.

Rick, Broteria 5 (1906) 9; Broteria 21 (1924) 137; Egatea 13 (1928) 435; Broteria 32 (1936) 74.

Effusa, gelatinosa, margine albo-lanoso, flavo-aurea; saepe etiam Ditiolae habitu erecto. Sporis 15x8 my, tricellularibus.

Ad cortices Bambusaeque.

A C. aurea Rick differt, quia magis gelatinosa tenaciorque.

Fungi Rickiani 12724, 12730, S. Leopoldo 1929-1930. — 22727. S. Salvador 1945.

Ceracea flava (B. et C.) Cragin, The Am. Nat. 20, 214.

Arrhytidea flava B. et C. — Saccardo 6,805.

Strata efformans parva, sparsa, quandoque confluentia, 8 mm lata; mycelio albo, hymenium glabrum aurantiacum ambiente; quandoque margine duplici. Sporis oblongis, 14-18x5-7 my, demum 3-septatis.

Ceracea brasiliensis Rick, n. sp.

Effusa, pallida, ceraceo-mollis sicca lutea. Sporis 6-7x4-5 my, in sicco triseptatis, luteolis.

Ad lignum mucidum.

Dacryomyces ovisporus Bref., sporis conveniens, forsan huc ducendus.

Ceracea subsulphurea Rick, n. sp.

Membranacea, resupinata, subcrassa, hyalino-subsulphurea, a substrato secernibilis, glabra, in sicco minutissime setulosa; margine delicato. Basidiis clavatis, mediis. Sporis 10-15x5-6 my, unicellularibus, apiculatis, subcurvulis, albis, in pulvere conglutinatis.

Ad corticem.

An C. flavae varietas?

Fungi Rickiani 12019. S. Leopoldo: Typus (sub Arrhytidea).

Ceracea cerea Rick, Broteria 32 (1936) 75.

Innata, tenuissima, subgelatinosa, colore ceraceo, sicco ochra-

ceo; margine initio albo-lanoso, indeterminato. Basidiis angustis. Sporis 12-15x8 my, 4-cellularibus, grosse obliqueque apiculatis.

Ad corticem.

Fungi Rickiani 12721, 14550, S. Leopoldo 1930-1939. — 17729, 20119, 20192, 22859 S. Salvador 1943-1944.

Ceracea aurea Rick, n. sp.

Aurea, sicca ochracea, margine albo-lanoso. Sporis grosse obliqueque apiculatis, 12-18x10 my. Basidiis 10 my latis, mediis, pedicellatis. Ad corticem.

A C. flava videtur diversa.

Arrhytidea Berkeley.

Arrhytidea nivea Rick, n. sp.

Resupinata, nivea, subiculo vitreo, gelatinoso-cartilaginosa, arcte adnata, granulosa, setulosa. Basidiis stipite communi botryose verticillatis, linearibus, 6 my latis, in stratum continuum unitis. Cystidiis linearibus aut clavatis, obtusis, 50-70x15-20 my, apice solum furfuraceo, verrucosis, prostantibus, non ita frequentibus. Sporis 6-8x3-4 my, cylindricis, hyalinis. Subiculum gelatinosum, sterile, dacryomyceti mucore occupato simile. Basidiis etiam dacryomycetiformibus, sterigmatibus tamen praeditis. Hyphis 9 my latis, tunica crassa. Peniophora gelatinosa Berk. prorsus alia species est, sporis basidiisque magnis instructa.

Arrhytidea gloecystidifera Rick, n. sp.

Albo-olivacea, velutina, virescens, viscoso-ceracea, immarginata, colliculosa. Basidiis longissimis, 6-8 my latis, sterigmatibus longissimis. Sporis 5-6x4-5 my, piriformibus. Gloecystidiis longis, flavidulis, 10 my latis, superne acutis.

Ad lignum.

Novi generis facile typus.

Dacryomyces Nees.

Dacryomyces fusco-minus Coke, Journ. El. Mitch. Soc. 35 (1920) 171.

Stipitata radicataque, cupula planiuscula, disco aureo; stipite crasso, albo. Sporis subellipsoideis, curvulis, 1-septatis, 8-12x4,5 my.

Ad lignum.

Vix 1 cm alta. D. phyllogenam C. et Mass. etiam inveni, quae tamen secundum Bresadola huius speciei solum forma. Heterotextus Lloyd secundum Neuhoﬀ = Ditiola.

Delortia Patouillard.

Delortia brasiliensis Rick, n. sp.

Pulvinuli 3-5 mm lati, hemisphaerici, vitrei, gelatinoso-diluti; hyphis 3 my, hyalinis, sparse pluriramosis. Basidiis in hypharum longissimarum apice, globoso-ovatis, 6-8 my; sterigmate subnullo. Sporis 20-30x15 my, fere annularibus, curvissimis, 3-4 cellularibus.

Ad corticem.

Egregia raraque species, sporis distinctissima. Basidia unicellularia eam extra Auriculariaceas Tremellaceasque ponunt; attamen propter basidium, quamvis parvum, ab hypha supportante tenuissima bene distinctum, verus Basidiomycetes, nec fungus imperfectus.

Fungi Rickiani 13091, S. Salvador 1939: Typus.

